
Cognome e nome Firma Matricola

Corso di Laurea: \diamond AUTL, \diamond INFL, \diamond MECL, \diamond MATL, \diamond AMBL, \diamond CIVL, \diamond GESL

Istruzioni

1. COMPILARE la parte precedente queste istruzioni, in particolare, **scrivere cognome e nome (in stampatello), firmare e segnare il proprio corso di laurea.**
 2. SCRIVERE, in modo incontrovertibile, la risposta nello spazio lasciato dopo ogni quesito; in caso di correzione, barrare la risposta errata e scrivere accanto la nuova risposta.
 3. I PUNTEGGI attribuiti per la risposta esatta sono indicati alla fine di ogni quesito.
 4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori, telefoni cellulari.
 5. CONSEGNARE **questo foglio e tutti i fogli di protocollo.**
 6. TENERE il foglio B come promemoria delle risposte date.
 7. TEMPO a disposizione: 150 min.
-

1. Sia data la seguente funzione f reale di variabile reale definita da:

$$f(x) = (x - 2) \log |x - 2|$$

Tracciare sul foglio di protocollo un grafico qualitativo della funzione f , in accordo con i risultati ottenuti. **[punti 1]**

Determinare il dominio di f ed eventuali simmetrie.

Risposta [punti 1]:

Calcolare i limiti alla frontiera del dominio e determinare eventuali asintoti (verticali, orizzontali, obliqui) per f .

Risposta [punti 2]:

Calcolare la funzione derivata prima di f e determinarne il dominio, classificando eventuali punti di non derivabilità.

Risposta [punti 1]:

Studiare la crescita e decrescita di f , calcolando, qualora esistano, punti di massimo/minimo relativo e punti di massimo/minimo assoluto per f : stabilire se f è limitata inferiormente/superiormente.

Risposta [punti 2]:

Calcolare la funzione derivata seconda di f e studiare la concavità e la convessità di f , calcolando gli eventuali punti di flesso per f .

Risposta [punti 1]:

2. Determinare $\inf A$, $\sup A$ ed eventualmente $\min A$, $\max A$, essendo

$$A = \left\{ \left\lfloor \frac{25}{3} - n \right\rfloor : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Risposta [punti 3]:

3. Determinare il luogo geometrico dei punti $z \in \mathbb{C}$ tali che

$$z \left(z + \frac{\sqrt{3}}{3}i \right) \operatorname{Re} \left(1 + 2i + z + \sqrt{3}i\bar{z} \right) = 0.$$

Risposta [punti 3]:

4. Calcolare le soluzioni complesse della seguente equazione (con la loro molteplicità)

$$(z^2 - 49i)(z^3 - 1) = 0$$

Risposta [punti 4]:

5. Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Calcolare il limite della successione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} \log \left[1 + \frac{\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}}{1 - \cos \frac{2}{n}} \right]$$

Risposta [punti 4]:

6. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \cos x + 1}{2x + x^2 + 1 - \frac{e^x - 1}{x}}$$

Risposta [punti 4]:

7. Sia $\beta \in \mathbb{R}$; e sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^4 + x^2}}{x^2 - 7x} & \text{se } x \neq 0 \text{ e } x \neq 7, \\ \beta & \text{se } x = 0 \\ 6 & \text{se } x = 7. \end{cases}$$

Si discuta al variare di $\beta \in \mathbb{R}$ la continuità di f nel suo dominio.

Risposta [punti 4]:
