


COGNOME E NOME
 CORSO DI LAUREA ANNO DI CORSO

FILA 4

1. Determinare l'ordinata y_G del baricentro della superficie piana non omogenea di massa m , qui sotto rappresentata, la cui densità di massa varia con la legge $\rho(P) = k x_P$ ($k > 0$), nel caso $\overline{OA} = \overline{OB} = \beta R$, $A\hat{O}B = \alpha$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\beta = 2$.



- A** $\frac{9}{16} R$; **B** $\frac{3(2 + \sqrt{3})}{8} R$;
 C $\frac{3\sqrt{3}}{16} R$; **D** $\frac{3}{8} R$.


2. Calcolare il centro del seguente sistema di vettori applicati paralleli

$$A_1(3, 0, 1), \quad A_2(2, 1, 1), \quad A_3(0, 0, 2),$$

$$\vec{v}_1(-1, -2, 3), \quad \vec{v}_2(2, 4, -6), \quad \vec{v}_3\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -1\right).$$

- A** $\left(\frac{2}{3}, \frac{14}{3}, 1\right)$; **B** $\left(\frac{13}{3}, -\frac{4}{3}, 3\right)$; **C** $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}, \frac{5}{4}\right)$; **D** $\left(\frac{12}{5}, \frac{4}{5}, -\frac{1}{5}\right)$.

3. Calcolare l'energia cinetica della lamina triangolare omogenea ($\overline{OA} = \overline{OB} = \beta L$, $A\hat{O}B = \frac{\pi}{2}$ e massa m) uniformemente rotante, con velocità angolare $\vec{\omega}$, attorno alla retta r appartenente al piano Oxy e formante un angolo $\alpha = \frac{\pi}{3}$ con Oy^+ , nel caso $\beta = 2$.



- A** $\frac{5}{12} mL^2\omega^2$; **B** $\frac{1}{8} mL^2\omega^2$;
 C $\frac{1}{2} mL^2\omega^2$; **D** $\frac{7}{48} mL^2\omega^2$.

AVVERTENZE:

1. Non è consentita la consultazione di testi e appunti.
2. Durata della prova: 45 minuti.
3. Punteggi: punti 3 per risposta esatta, punti 0 per risposta non crocettata, punti -1 per risposta errata.
4. Ammissione alla 2^a prova scritta con punti 5.