

PROBABILITÀ E STATISTICA - 27.03.2008

COGNOME E NOME

C. D. L.: AMBL CIVL CIVLS GESL INFL ANNO DI CORSO: 1 2 3 ALTRO

MATRICOLA FIRMA FILA 1

ISTRUZIONI

1. COMPILARE la parte precedente queste istruzioni; in particolare, **scrivere cognome e nome (in stampatello) e firmare.**
2. SCRIVERE, in modo incontrovertibile, la risposta nello spazio lasciato **dopo** ogni quesito; in caso di correzione, barrare la risposta errata e scrivere accanto la nuova risposta. In particolare, per gli esercizi (E1) ed (E2), SCRIVERE **anche** il procedimento applicato per rispondere ai quesiti posti.
3. I PUNTEGGI attribuiti per la risposta esatta sono indicati alla fine di ogni quesito.
4. PROIBITO usare libri, quaderni, telefoni cellulari.
5. CONSEGNARE **questi fogli e tutti i fogli di protocollo.**
6. TEMPO a disposizione: 150 min.

Quesito	C1	C2	C3	C4	QT	E1	E2	TOT
Punti								

(C1) Sia X una variabile casuale distribuita normalmente con media μ e varianza 4. Calcolare μ affinché $P[X > 3.6] = 0.0778$.

[PUNTI 4]

C1 (scrivere il risultato con due decimali)

(C2) La probabilità di vincere in una determinata lotteria settimanale è $p = 0.0002$. Supponendo di giocare tutte le settimane, calcolare la probabilità di vincere almeno due volte in 20 anni (utilizzare un'opportuna approssimazione).

[PUNTI 4]

C2 (scrivere il risultato con cinque decimali)

(C3) Sia X una variabile casuale con funzione di ripartizione

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ \ln x & 1 < x \leq e \\ 1 & x > e \end{cases}$$

Calcolare la probabilità condizionata $P[X > \sqrt{e} \mid -1 < X < e^3]$.

[PUNTI 4]

C3 (scrivere il risultato in frazione ridotta ai minimi termini)

(C4) Si suppone che la temperatura giornaliera nel mese di aprile sia una variabile casuale uniformemente distribuita sull'intervallo $[15^{\circ}\text{C}, 20^{\circ}\text{C}]$. Qual è la probabilità che in una settimana la temperatura superi i 18°C in 4 giorni su 7?

[PUNTI 4]

C4 (scrivere il risultato con cinque cifre decimali)

Quesito Teorico

Siano A, B, C tre eventi tali che A sia indipendente da B e da C , B e C siano incompatibili. Dimostrare che

$$P[A|B \cup C] = P[A].$$

[PUNTI 2]

(E1) Sia (X, Y) una coppia di variabili casuali discrete con la seguente densità di probabilità congiunta

	X	0	1	3
Y				
-1		$\frac{p}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
1		$\frac{p}{4}$	$\frac{1}{4}$	0

- (a) determinare il valore di p ;
 (b) calcolare il coefficiente di correlazione $\rho[5X, 3Y]$.

[PUNTI 7]

(E2) Sia X_1, \dots, X_n un campione casuale di ampiezza n , estratto da una popolazione distribuita con la densità di probabilità

$$f_X(x, \theta) = \begin{cases} \frac{3}{\theta} e^{-3(x-2)/\theta} & \text{se } x > 2, \\ 0 & \text{altrove,} \end{cases}$$

con $\theta \in \mathbb{R}^+$,

- (a) determinare lo stimatore di massima verosimiglianza T di θ ;
- (b) verificare se lo stimatore T è corretto;
- (c) calcolare l'errore quadratico medio $\text{MSE}[T]$;
- (d) verificare che T è consistente.

[PUNTI 7]

