

PROBABILITÀ E STATISTICA - 03.07.2007

COGNOME E NOME

C. D. L.: AMBL CIVL CIVLS GESL INFL ANNO DI CORSO: 1 2 3 ALTRO

MATRICOLA FIRMA FILA 4

ISTRUZIONI

1. COMPILARE la parte precedente queste istruzioni; in particolare, **scrivere cognome e nome (in stampatello) e firmare.**
2. SCRIVERE, in modo incontrovertibile, la risposta nello spazio lasciato **dopo** ogni quesito; in caso di correzione, barrare la risposta errata e scrivere accanto la nuova risposta. In particolare, per gli esercizi (E1) ed (E2), SCRIVERE **anche** il procedimento applicato per rispondere ai quesiti posti.
3. I PUNTEGGI attribuiti per la risposta esatta sono indicati alla fine di ogni quesito.
4. PROIBITO usare libri, quaderni, telefoni cellulari.
5. CONSEGNARE **questi fogli e tutti i fogli di protocollo.**
6. TEMPO a disposizione: 150 min.

Quesito	C1	C2	C3	C4	QT	E1	E2	TOT
Punti								

(C1) Sia X una variabile casuale distribuita normalmente con media 48 e varianza 36. Calcolare a in modo tale che $P[|X - 48| \geq a] = 0,05$.

[PUNTI 4]

C1 (scrivere il risultato con due decimali)

(C2) La popolazione di Nicosia (Cipro) è per l' 80% greca e per il 20% turca. Dei greci il 20% parla inglese, dei turchi il 10%. Un visitatore incontra in città un uomo che parla inglese. Qual è la probabilità che sia greco?

[PUNTI 4]

C2 (scrivere il risultato in frazione ridotta ai minimi termini)

(C3) Sapendo che la probabilità che si verifichi a Brescia almeno un terremoto in un anno è pari a $\frac{1}{6}$, si determini il numero medio di terremoti in un anno.

[PUNTI 4]

C3 (scrivere il risultato con cinque decimali)

(C4) Siano X e Y due variabili casuali esponenziali indipendenti di parametri 4 e 1 rispettivamente. Calcolare $P[X + Y < 3]$.

[PUNTI 4]

C4 (scrivere il risultato con cinque decimali)

Quesito Teorico

Date due variabili aleatorie X, Y , dimostrare che

$$E[X]E[Y] = E[XY] + \text{cov} \left[-\frac{3}{2}X, \frac{2}{3}Y \right]$$

[PUNTI 2]

(E1) Sia X_1, \dots, X_9 un campione casuale di ampiezza 9, estratto da una popolazione distribuita con la densità di probabilità

$$f_X(x) = \begin{cases} 7\theta x + 1 - \frac{7\theta}{2} & \text{se } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{altrove,} \end{cases}$$

con $0 < \theta < \frac{2}{7}$.

- (a) Determinare uno stimatore T_1 di θ con il metodo dei momenti.
- (b) Verificare se lo stimatore T_1 è non distorto.
- (c) Si consideri lo stimatore $T_2 = \frac{6}{7}(X_1 + X_2 - 1)$. Indicare quale dei due stimatori T_1 e T_2 sia preferibile, motivando la risposta.

[PUNTI 7]

(E2) Sia X una variabile casuale avente densità di probabilità

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{x}} & \text{se } 0 < x \leq 9, \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

- (a) Calcolare la costante k di normalizzazione.
- (b) Determinare la funzione di ripartizione F_X .
- (c) Calcolare $\text{var}[X]$.
- (d) Calcolare $P[4 \leq X \leq 18]$.
- (e) Calcolare $E[\sqrt{X}]$.

[PUNTI 7]

